



# 脳室・腹腔シャント術を受けられた方へ

## こんな症状はありませんか？

1. 頭が重い、頭痛がする
2. 気持ちが悪い、吐いてしまう
3. ボーっとする、集中力が低下した
4. 歩き方がぎこちなくなった、つまずきやすい  
手足の動きが調子悪い
5. 失禁をするようになった

シャントは水頭症を認めた方に対して頭の中に髄液がとどこおるのを防ぐためのものです。

これらの症状はシャントの効果が低下したため、脳室が拡大したり、頭の中の圧が上昇した事によって起こるものです

**シャント装置に問題がある可能性があります。**

**早めに脳神経外科へ受診して下さい。**

(入院中の方は担当医へご相談下さい)

## 可変式バルブを使っている方へ

1. 精密機械が内蔵されています。  
外傷には特に注意して下さい。
2. MRI 検査などを受ける場合は注意して下さい。  
磁場により圧力が変わることがあります。

圧力は頭部の単純写真を撮影する事で分かります。

(設定圧は手術を受けた病院で分かります)

また圧力の調整は手術をしなくても外から機械を用いて調節することができます。

## 小児期にシャント手術を受け、成長期を迎えた方へ

成長によりお腹の中のシャントチューブが足りなくなることがあります。

脳神経外科受診の上、定期的な X 線検査を受けて下さい。

**~ご不明な点がございましたら、担当医まで御相談下さい~**